1758.

Une deuxe fois

Observation

Sur un pouce arraché

Par m. hélie. libre

Le 25 decembre 1757 Jean Queot agé de Soixante ans environ, ~~homme~~ d'une vigueur et d'une corpulence qui n'est point ordinaire, + en descendant l'escalier de Md.e la veuve Amiot dont il est le cocher, fit une chute d'un premier etage. aussitot on accourut au bruit, et ayant vû une certaine quantité de sang repandu, on le conduisit a sa chambre, ou il s'apperçut avoir perdu le pouce de la main droite.

+ et dont on peut juger par la grosseur du pouce. dont la figure est a la suite de l'observation,

Le Chirurgien + pour lors requis, après toutes les informations convenables, appliqua un appareil simple et s'étant transporté au lieu de la chute

+ Mr. Lorrain chirurgien d'une compagnie des gardes françaises

ARC 42 n° 53

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE

après plusieurs recherches, trouva
le pouce accroché a une ~~des~~ pointe
de la rampe de l'escalier, et voici
ce qu'il y a remarqué.

1°. le trou par lequel est entrée la
pointe de fer qui a percé la peau
a la base de la derniere phalange,
a fendu le tendon fléchisseur, et
s'est fixée a une cicatrice qui
se remarque encore a l'extremité
du pouce; cette cicatrice est la
suite d'un panaris de la qua
trieme espece dont le malade
a été traité a troyes en champa
gne il y a 12 ans, et dans le
quel il a perdu la moitié de
la derniere phalange.

—

2°. la peau separée visavis l'arti
culation

de la 2e phalange ~~et de~~ avec la 3e.

3o. une esquille de la 2e phalange qui reste attachée a la 3e.

4o deux muscles qui ont suivi le pouce, scavoir le flechisseur propre et le long. Extenseur dont la longueur surpasse dix pouces, ce qui donne lieu de croire qu'ils se sont detachés dans leurs principes, ou auprès de leurs principes, c'est adire de leurs attaches superieures

5o. enfin quatre arteres de la longueur d'un demi pied. environ

Le chirurgien par l'examen du pouce ayant reconnu une fracture, ~~jusqua~~ leva l'appareil le landemain matin, et trouva la 2e phalange fracturée en long jusqu'a son articulation avec la premiere et formant trois esquilles

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

Esquills. il fit retirer la peau du

coté de l'avantbras par un aide,

et sans la couper, fit l'amputation

de cette phalange dans l'article,

il n'est point survenu d'hemorragie

j'ay suivi le malade, les pansemens ont eté methodiques

le malade a eté saigné cinq fois,

il y a eu pendant quelques jours

un gonflement a l'avantbras,

qu'on a recouvert simplement

avec des compresses trempées dans d'eau de vie

la main n'a jamais eté enflée,

la suppuration s'est bien etablie,

et le malade a eté gueri en moins

de 40 jours.

On lit dans le second volume

des memoires de l'academie deux

exemples a peu pres semblables.

mais celuici est plus extraordinaire

par la complication de la fracture
qui a exigé l'amputation de
l'autre phalange, et par la quantité
des parties qui ont accompagné le
pouce dans l'arrachement

Pelié

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE

No 43

figure 1e

represente le pouce vû par sa ~~partie~~ face -- ~~posterieure~~ externe

figure. IIe

Representte le pouce vû par sa face ~~partie~~ interne

A la cicatrice du panaris que le malade a eu il y a 12 ans

B. la dechirure de la peau faite par la pointe de la rampe de l'escalier.

C. le muscle flechisseur propre

D. le long extenseur

EEEE. les quatres arteres.

fig. IIe



fig. 1re

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE